

モナリザタッチ® 治療説明・同意書

産科・婦人科 江川クリニック 院長 江川 晴人

京都市東山区大橋町 102-1 田中ビル 4 階

TEL : 075-708-3627

モナリザタッチ®とは、閉経など女性ホルモンが減少するために起こる膣萎縮を、レーザーにより改善する施術です。お顔のリフトアップやたるみ改善に使われるリジュビネーション（若返り）の技術を女性器（膣と外陰部）に応用し、乾燥、かゆみ、におい、性交時の違和感や痛み、膣のゆるみ、排尿障害（頻尿や尿もれなど）といった、様々な不快な症状を改善するために開発されたメソッドです。外陰部に照射することで、しわやたるみを改善し、ふっくらとした皮膚への変化も期待できます。

【適 応】

- ・膣萎縮による不快症状（乾燥、かゆみ、におい、性交時の違和感や痛み、ゆるみ、尿もれなど）のある方
- ・乳がん既往などでホルモン療法ができない若年層の方 ・出産などで変化した膣環境の改善を望まれる方
- ・外陰部のしわ、たるみが気になる方 ・パートナー（男性）が膣の状態改善を望んでいる方

項目	モナリザタッチ	外陰部リジュビネーション
施術の流れ	① 問診、カウンセリング、内診を行います ② 膣内に専用プローブを挿入し、レーザーを数分間照射します	① 問診、カウンセリングを行います ② 麻酔クリームを塗布します ③ 麻酔クリームをふき取り、レーザーを照射します ④ レーザー照射後、薬剤を塗布し冷却します
施術効果	膣のかゆみやニオイ、乾燥、性交痛、ゆるみなどの改善が期待できます。また、海外では尿失禁などの排尿障害の改善も報告されています。	外陰部にハリがでて、しわ、たるみの改善が期待できます。
リスクと副反応	施術直後、熱感を感じることがあります。まれに照射後に、軽微な痛みや出血を生じる場合もありますが、通常は数日で自然に治まります。	照射直後、日焼けをした感じのほてり感、ヒリヒリ感、腫れが生じますが、2～3時間ほどで落ち着きます。
術後経過と術後の注意	施術後3日間は、性交渉を避けてください。 公衆浴場などでの入浴は避けてください。 当日からシャワー浴は可、入浴は翌日からとしてください。	施術後2～3日目から施術部位にドット状のかさぶたが発生して、約1週間で徐々にはがれてきます。（個人差があります）かさぶたが剥がれる時期は多少のかゆみを感じる場合がありますが、無理に擦ったりしないよう注意してください。施術後1週間は、外陰部を清潔に保ち、保湿を十分に行ってください。

【施術を受けられない方】

- ・現在、生殖器感染症を罹患している方（カンジダ症、トリコモナス膣炎、性器ヘルペスなど）
- ・現在、外陰部皮膚炎を罹患している方（乾癬、脂漏性皮膚炎、扁平苔癬）
- ・外陰部または子宮頸部に新生腫瘍のある方、またはその疑いのある方（硬化性苔癬、扁平上皮過形成、HPV、線維腫、VIN、CIN など）
- ・子宮脱の方（担当医が診察し、程度により判断します）
- ・膣内に過度な炎症（膣炎）のある方、悪性腫瘍のある方、またはその疑いのある方
- ・月経中の方 ・妊娠または妊娠の可能性のある方（安全性がはっきりしていません）
- ・抗凝血薬、レチノイド、アキュテインなどを服用している方、光増感剤を服用している方

同 意 書

私は、この施術について十分な説明を受け、内容を理解いたしましたので、本施術を受けることに同意します。

同意日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

署名： _____